



Skala hospitalne anksioznosti i depresivnosti (HAD) kao skrining instrument u pacijenata oboljelih od uznapredovalog raka — preliminarni rezultati

MAJA B.1, BRAŠ M.2, ĐORĐEVIĆ V.2, KRALJ-ŠKOC V.3

1 AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI, ZAGREB, CROATIA

- SLUŽBA ZA RAZVOJ, ISTRAŽIVANJE I ZDRAVSTVENE TEHNOLOGIJE

2 KBC ZAGREB, ZAGREB, CROATIA

- KLINIKA ZA PSIHOLOŠKU MEDICINU

3 KBC ZAGREB, ZAGREB, CROATIA

- KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

SAŽETAK:

Cilj istraživanja je bila kritička analiza HAD (eng. Hospital Anxiety and Depression) skale u populaciji pacijenata oboljelih od uznapredovalog metastatskog raka kod kojih ne postoji mogućnost izlječenja. Pokušali samo odrediti valjane cut-off vrijednosti, ocijeniti osjetljivost i specifičnost svake pojedine čestice kao i njihovu faktorsku strukturu. U istraživanju je sudjelovalo $N = 46$ ispitanika, stupanj bolesti III ili IV, ECOG = 0-3, prognoze preživljenja 6 do 12 mjeseci; svi ispitanici su zadovoljili na testu kognitivnih sposobnosti (MOCA test (eng. Montreal Cognitive Assessment)). Unutarnja pouzdanost čestica je zadovoljavajuća (Chronbah $\alpha = 0,831$) a faktorskom analizom potvrdili smo dvo-faktorsku strukturu upitnika. Osjetljivost i specifičnost skale anksioznosti i depresivnosti, kao i ukupnog rezultata („emocionalna uznemirenost“) nisu zadovoljavajuće. Temeljem dobivenih nalaza preporučamo oprez prilikom korištenja HAD skale kao skrining instrumenta depresivnosti i anksioznosti u pacijenata oboljelih od uznapredovalog raka.

[HTTP://DX.DOI.ORG/10.17486/GYR.3.2221](http://dx.doi.org/10.17486/GYR.3.2221)